



Cidetrak CM

FICHA
TÉCNICA



Produto difusor de vapor (VP) destinado a combater o bichado-da-fruta em pomares de macieiras, pereiras e marmeleiros, pelo método de confusão sexual, através da libertação da feromona de *Cydia pomonella* ou (E, E)-8-10-Dodecadien-1-ol.

COMPOSIÇÃO: Cada difusor contém 230 mg de feromona sexual ou 4,6 % (p/p) de (E, E)-8-10-Dodecadien-1-ol

Autorização de venda nº 1230 concedida pela DGAV

MODO DE AÇÃO

CIDETRAK® CM é um Produto difusor de vapor (VP) destinado a combater o bichado-da-fruta em pomares de macieiras, pereiras e marmeleiros, pelo método de confusão sexual, através da libertação da feromona de *Cydia pomonella* ou (E, E)-8-10-Dodecadien-1-ol.

O método de confusão sexual baseia-se na libertação permanente de uma adequada concentração de feromona na parcela de terreno a partir de difusores que contêm a feromona sexual de síntese, igual à que é produzida na natureza pelas fêmeas do bichado-da-fruta, tendo por objetivo confundir os machos.

Os machos não conseguem localizar as fontes emissoras (quer fêmeas, quer difusores), de modo que a cópula só se verifica casualmente. Não havendo contacto entre os dois sexos não haverá reprodução, as fêmeas não põem ovos férteis e as lagartas que causam os estragos nos frutos não chegam a aparecer. O método de confusão sexual vai assim reduzindo de ano para ano, de modo gradual, a população da praga.

Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico.



Cidetrak CM

FICHA TÉCNICA



RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
Macieira	Bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	500 difusores/ha	Na Primavera antes do aparecimento dos primeiros adultos ou logo que se verifiquem as primeiras capturas nas armadilhas de monitorização. N.º máximo de aplicações: 1
Marmeleiro			
Pereira			

MODO DE APLICAÇÃO

Os difusores devem ser posicionados na parcela antes do início do voo de primeira geração do bichado-da-fruta. Uma única distribuição de CIDETRAK® CM (correspondente a 120-140 dias de persistência dos difusores) é suficiente para garantir uma longa duração no período de risco (2 a 3 gerações).

Os difusores devem ser distribuídos homogeneamente no pomar (e escalonados de uma linha para outra).

A sua instalação deve ser executada imperativamente no terço superior da copa (preferencialmente a 30-40 cm abaixo do topo das copas das árvores) para evitar os ramos que provavelmente descem durante o estágio de desenvolvimento dos frutos.

O número de difusores nas bordaduras deve ser reforçado com 10% de difusores adicionais. As cercas, portões sebes vivas e corta ventos também devem ser protegidos com difusores.

É aconselhável o uso de tratamentos adicionais com inseticidas (autorizados para combater a praga), de acordo com:

- Recomendações gerais emitidas pelo Serviço Nacional de Avisos Agrícolas e com as indicações do técnico encarregado da monitorização,
- Se os danos observados nos frutos excederem o limiar de 0,5% dos frutos atacados.



Cidettrak CM

FICHA TÉCNICA



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CRE)



Palavra sinal: Atenção

Advertências de Perigo:

H410: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de Prudência:

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P103: Ler o rótulo antes da utilização.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P280: Usar luvas de proteção e proteção facial.

P308+P311: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P332+P313: Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P391: Recolher o produto derramado.

P501a: Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Frases EUH:

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Frases adicionais:

Armazenar em local seco, fresco e escuro em recipiente fechado. Para períodos longos de armazenamento a temperatura não deve exceder 5°C.

SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície.

Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Produto Fitofarmacêutico de Baixo Risco (Art. 47º).



Cidetrak CM

FICHA TÉCNICA



Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 808 250 250.

SPPT3 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num centro de receção autorizado

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar por acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Titular da autorização de venda:	Distribuído por:
Certis Belchim BV Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht PO box 607, 3500 AP Utrecht, Países Baixos Telef.: +31 (0)30 200 1200	Certis Belchim Portugal, Unipessoal, Lda Avenida do Brasil, nº 2E, loja 6, 3080-323 Figueira da Foz Portugal Telef. 233109482 www.certisbelchim.pt

Embalagens: caixas de 1500 difusores (6 bolsas de 250 difusores). 1 caixa = 3 ha de pomar

Esta ficha técnica é uma ficha meramente informativa que não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto.